



Brief gestuurd aan het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie betreffende trombolysie in het artikel Antithrombotische behandeling: indicaties en praktische problemen (Folia Februari 2004)

In de Folia van februari 2004 wordt bij de behandeling van het acuut ischemisch CVA gesteld dat “Er nog geen eensgezindheid is over het gebruik van trombolytica bij het ischemisch cerebrovasculair accident: het is nog niet bewezen dat het eventuele voordeel van een dergelijke behandeling opweegt tegen de risico’s en de kostprijs ervan.” De auteur verwijst hierbij naar een narratieve, niet-systematische review in de Lancet.¹

Wij willen erop wijzen dat tPA in Europa onder strikte voorwaarden geregistreerd is voor de indicatie ischemische beroerte na kritische, onafhankelijke analyse van de bewijzen voor het nut van deze behandeling.² Op evidentie gebaseerde richtlijnen van verschillende professionele organisaties adviseren deze behandeling.^{3,4} Een recente metaanalyse van de individuele patiëntengegevens uit 6 gerandomiseerde trials die patiënten met tPA behandelden kwam tot dezelfde conclusie.⁵

Wij zijn het eens dat bijkomende gegevens nodig zijn om het nut en de veiligheid van deze behandeling in welbepaalde situaties aan te tonen, zoals bij patiënten die hoogbejaard zijn of bij patiënten die laattijdig het ziekenhuis bereiken. Onder andere om de veiligheid en doeltreffendheid van trombolysie in deze situaties te bestuderen zijn twee gerandomiseerde gecontroleerde klinische onderzoeken (IST 3 en ECASS III) en 1 fase IV studie (SITS-MOST) in Europa lopende.

Het effect van de behandeling bij die patiënten waar wel voldoende evidentie voor bestaat minimaliseren lijkt ons bij gevolg niet opportuun gezien de enorme persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van alle vormen van beroerte.

- 1 Warlow C, Sudlow C, Dennis M, Wardlaw J, Sandercock P. Stroke. Lancet 2003;362(9391):1211-1224.
- 2 Kaste M. Approval of alteplase in Europe: will it change stroke management? Lancet Neurol 2003;2(4):207-208.
- 3 Hacke W, Kaste M, Bogousslavsky J, Brainin M, Chamorro A, Lees K, et al. European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management-update 2003. Cerebrovasc Dis 2003;16(4):311-337.
- 4 Adams HP, Jr., Adams RJ, Brott T, del Zoppo GJ, Furlan A, Goldstein LB, et al. Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke: A scientific statement from the Stroke Council of the American Stroke Association. Stroke 2003;34(4):1056-1083.
- 5 The ATLANTIS ECASS and NINDS rt-PA Study Group Investigators. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 2004;363:768-774.