

Colostrum bovin dégraissé congelé

Cette fiche permet une utilisation optimale du colostrum bovin dégraissé. Il est important de respecter rigoureusement les étapes et les indications qui sont mentionnées.

Une erreur peut entraîner la destruction des anticorps et rendre la protection de l'animal totalement nulle.

Il est important de noter que pour être bien protégé en cas de diarrhée, un veau doit recevoir 100 millilitres de sérum par jour pendant 5 jours. Le sérum peut être administré à partir du 2^{ème} jour jusqu'au 31^{ème} jour.

Si vous chauffez le produit à plus de 45°C, les anticorps sont détruits et il n'y aura pas de protection

Etape 1

Le lactosérum doit être administré pendant 5 jours à raison de 50 ml le matin et 50 ml le soir. Il peut être administré à partir du 2^{ème} jour jusqu'au 31^{ème} jour.

Utiliser le lactosérum au moment de la diarrhée.

Le produit peut être mélangé ou à tout autre alimentation du veau.



Etape 2

Décongeler les bouteilles dans unseau d'eau tiède (35°C - 40°C).

Ne pas utiliser une eau trop chaude sinon les anticorps seront détruits et il n'y aura pas de protection.

Ne pas décongeler le lactosérum CER au four à micro-ondes car cela entraîne des modifications de structure des anticorps et la protection du veau n'est plus optimale.

Veillez à bien respecter les consignes de l'étape 2 sinon le produit perdra son efficacité.

Etape 3

Distribuer le lactosérum au veau lorsqu'il est bien décongelé et a atteint une température de 30°C - 35°C.

L'administration du colostrum se fait en 5 jours à raison de 50ml le matin et 50ml le soir.

Distribuer le produit directement dans la gueule du veau avec une seringue ou directement de l'alimentation.

Si l'animal souffre déjà de diarrhée, le premier jour, donner 100ml le matin et 100ml le soir. Ensuite, achevez normalement la bouteille. Le lactosérum peut être distribué jusqu'à disparition des symptômes.

Les bouteilles de lactosérum du CER peuvent se conserver 1,5 an dans le congélateur et 1 semaine dans le frigo.